

REPTILES

DE LA

GUINÉE ESPAGNOLE

PAR

G. A. BOULENGER,

Membre de la Société Royale; Vice-président de la Société Zoologique de Londres.

J'ai donné précédemment, dans ces *Mémoires*, une liste des Batraciens recueillis par M. Martinez de la Escalera au Cap Saint-Jean. M. le Professeur Bolivar me prie d'en faire autant pour les Reptiles qu'il a bien voulu m'envoyer à l'examen. Ceux-ci n'ajoutent guère à nos connaissances, à l'exception d'un *Mabuia* qui a été confondu jusqu'ici avec des espèces voisines.

Chelonia.

Testudinidæ.

Cinyxis erosa Schw.

Emydosauria.

Crocodilidæ.

Osteolæmus tetraspis Cope.

Lacertilia.

Geckonidæ.

Hemidactylus fasciatus Gray.

Varanidæ.

Varanus niloticus L.

Lacertidæ.

Poromera fordii Hallow.

Holaspis guentheri Gray.

Scincidæ.

Mabuia raddonii Gray.

Mabuia albilabris Hallow.

Cette espèce a été décrite par Hallowell, Proc. Ac. Philad., 1857, p. 51, d'après un individu du Gabon, et je l'ai rapportée, avec doute, à la synonymie de *M. raddonii Gray (blandingii Hallow.)* Ayant reçu récemment d'assez nombreux individus de Benito, du Cap Saint-Jean, et de Efulen, Sud Cameroun, qui s'accordent plus ou moins parfaitement avec la description de Hallowell, je crois pouvoir maintenir, tout au moins provisoirement, *M. albilabris* comme espèce distincte. Les carènes (3 ou 5) des écailles dorsales sont plus fortes, et les plaques préfrontales forment le plus souvent une suture médiane, comme chez *M. perroteti* D. et B., tandis que chez *M. raddonii* la nasofrontale est presque toujours en contact avec la frontale. La ligne latérale claire, qui s'étend de la lèvre supérieure à la base du membre postérieur, s'efface chez les mâles, dont les lèvres et les côtés du cou sont d'un bleu verdâtre; les faces inférieures sont grisâtres ou bleuâtres, rarement blanches comme chez *M. raddonii*. L'adulte ne semble pas dépasser une longueur de 80 millimètres, du museau à l'anus (femelles pleines), de même que *M. raddonii*.

Pour quiconque est à même de comparer cette espèce et *M. raddonii* à la grande espèce décrite sous le nom de *Euprepes*

perroteti D. et B., et qui habite la Sénégambie et Sierra Leone, il est à peine nécessaire de réfuter l'opinion émise par Tornier que *M. raddonii* n'est que la jeune de *M. perroteti*. Cette dernière espèce a les formes plus robustes, les doigts et les orteils plus courts, et les lobules de l'oreille plus développés et plus pointus; les plaques préfrontales forment une suture médiane chez les nombreux sujets que j'ai pu examiner.

Les spécimens de Togo décrits par Tornier (Arch. f. Nat., 1901, Beiheft, p. 82), appartiennent probablement à *M. albilabris*.

Lygosoma fernandi Burt.

Anelytropidæ.

Feylinia currori Gray.

Rhiptoglossa.

Chamæleontidæ.

Chamæleon gracilis Hallow.

— *cristatus* Stutchb.

Ophidia.

Boidæ.

Calabaria reinhardti Schlg.

Colubridæ.

Tropidonotus fuliginoides Gthr.

Gastropyxis smaragdina Schlg.

Thrasops flavigularis Hallow.

Dipsadomorphus pulverulentus Fisch.

Dipsadoboa unicolor Gthr.

Thelotornis kirtlandii Hallow.

Naia melanoleuca *Hallow.*

Dendraspis jamesonii *Traill.*

Viperidæ.

Causus lichtensteini *Fan.*

Bitis nasicornis *Shaw.*

Atheris squamiger *Hallow.*

Madrid, 1.º de Abril de 1905.